DOI:10.13210/j.cnki.jhmu.20160831.018

网络出版地址: http://www.cnki.net/kcms/detail/46.1049.R.20160831.1133.036.html

海南槟榔提取物中多酚和槟榔碱的含量测定

周丹¹, 刘启兵¹, 刘月丽¹, 翟锐锐¹, 姚瑰玮¹, 易西南² ✉

(1. 海南医学院药学院, 海南 海口 571199; 2. 海南医学院解剖学教研室, 海南 海口 571199)

[摘要] 目的: 测定海南槟榔乙醇提取物中多酚和槟榔碱的含量。方法: 多酚的含量分析采用分光光度法, 以没食子酸为对照品, 以 $\text{FeCl}_3\text{-K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 为显色剂, 在 720 nm 处进行测定; 槟榔碱的含量分析采用高效液相色谱法, 色谱柱为 C_{18} 柱, 流动相组成为乙二胺、甲醇和乙腈, 检测波长为 215 nm, 流速 1.0 mL/min。结果: 海南槟榔乙醇提取物中多酚的含量为 10.54 mg/g, 线性范围为 0.096~0.576 $\mu\text{g}/\text{mL}$, 平均回收率为 101.40%, RSD 为 0.88%; 海南槟榔乙醇提取物中槟榔碱的含量为 1.935 $\mu\text{g}/\text{g}$, RSD 为 1.8%。结论: 该方法简单快捷, 重现性好, 适合于海南槟榔乙醇提取物中多酚和槟榔碱的含量测定。

[关键词] 槟榔; 提取物; 多酚; 槟榔碱

[中图分类号] R93 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1007-1237(2016)19-2224-04

Determination of total polyphenols and arecoline in ethanol extracts from *Areca Catechu*

ZHOU Dan¹, LIU Qi-bing¹, LIU Yue-li¹, ZHAI Rui-rui¹, YAO Gui-wei¹, YI Xi-nan² ✉

(1. School of Pharmacy, Hainan Medical University, Haikou 571199, China; 2. Department of Anatomy, Hainan Medical University, Haikou 571199, China)

[Foundation Project]: It is supported by Hainan Science and Technology Plan Projects (NO. ZDXM20120050).

[Author]: ZHOU Dan (1981-), Female, M.M., Associate professor, Tel: 13617547317, E-mail: zhoudan1014@126.com.

[Correspondence to]: YI Xi-nan (1962-), M.M., Researchers Professor, Tel: 66987170, E-mail: 1272791897@qq.com

Received: 2016-07-12 Revised: 2016-07-28

JHMC, 2016; 22(19): 2224-2227

View from specialist: It is creative, and of certain scientific and educational value.

[ABSTRACT] **Objective:** To establish a method for determination of total polyphenols and arecoline in ethanol extracts from *Areca catechu*. **Methods:** The content of total polyphenols was determined by spectrophotometry at 215 nm, with the mixture solution of FeCl_3 and $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ as the color developing agent. The content of arecoline was analyzed by HPLC. Hypersil BDS C_{18} was used and the mobile phase was consisted of diethylamine, metanol and acetonitrile. The detection wavelength was 215 nm, and the flow rate was 1.0 mL/min. **Results:** The content of total polyphenols in ethanol extracts from *Areca catechu* was 10.54 mg/g. Calibration graphs were constructed in the range of 0.096-0.576 $\mu\text{g}/\text{mL}$. The average recoveries were 101.40%. The RSD of the methods was 0.88%. The content of arecoline was 1.935 $\mu\text{g}/\text{g}$, with the RSD of 1.8%. **Conclusions:** The method was brief, fast, accurate, and suitable for the content determination of total polyphenols and arecoline in ethanol extracts from *Areca catechu*.

[KEY WORDS] *Areca catechu*; Ethanol extracts; Total polyphenols; Arecoline

槟榔 (*Areca nut*, *Betel nut*) 是棕榈科 (*Pal-*
maceae) 植物槟榔 (*Areca catechu* L.) 的干燥成熟种

子, 别名有榔玉、宾门 (广东)、仁频、国马 (云南)、青
仔 (台湾)、大肚子等^[1]。槟榔原产于斯里兰卡, 在我

[基金项目] 海南省科技计划项目 (ZDXM20120050)

[作者简介] 周丹 (1981-), 女, 湖南望城人, 硕士, 副教授, 电话: 0898-66972095, 13617547317, E-mail: zhoudan1014@126.com。

[通讯作者] 易西南 (1962-), 男, 湖南醴陵人, 博士, 教授, 电话: 0898-66987170, E-mail: 1272791897@qq.com。

[收稿日期] 2016-07-12 **[修回日期]** 2016-07-28 **网络出版时间:** 2016-08-31 11:33:34

国主要分布于广东、福建、台湾、海南、云南。槟榔是四大南药之一,其种子、果皮、花均可入药^[2]。槟榔味苦、辛,性温,具有消积驱虫、降气,行水的功能,用于食积腹痛、泻痢后重、绦虫病、蛔虫病、疟疾等^[1]。国内外对槟榔的化学成分研究结果表明槟榔含有生物碱、酚类、氨基酸、多聚糖、矿物质、粗纤维、脂肪油、维生素、红色素等^[3]。槟榔的药理活性研究表明槟榔具有抗细菌、真菌和病毒作用、抗老化、降低胆固醇、抗氧化、抗抑郁、抗癌等^[4-6]。

槟榔的活性物质主要包括生物碱、酚类^[7]。槟榔碱,在众多生物碱是含量最高,同时也是槟榔中最主要的保健和药理活性成分^[8]。槟榔碱的药理生理活性研究主要集中在驱虫作用、刺激交感神经以及兴奋 M 胆碱受体、提神作用、抗动脉粥样硬化、抗炎症、抗氧化作用、抗血栓形成作用等^[7,9]。目前槟榔碱含量的测定方法主要有酸碱滴定法、薄层扫描法、毛细管电泳法、分光光度法、高效液相色谱法等^[10]。由于槟榔中槟榔碱以与鞣质结合形式存在,用滴定法只能测定总生物碱的含量,薄层扫描法、毛细管电泳法对仪器的要求较高或操作繁琐,而高效液相色谱法以操作简单、准确度高、重复性好等优点被广泛采用。

近期许多研究表明,槟榔的许多功效如抗细菌、真菌和病毒的作用、抗老化作用、降低胆固醇作用、抗氧化作用、抗凝血酶作用等都与其所含的活性成分多酚有关^[1]。槟榔中多酚类物质包括缩合鞣质、水解类鞣质和非单宁黄烷醇等。测定多酚的常用方法有高锰酸钾滴定法、香草醛法、福林酚比色法(Folin-酚法)和铁氰化钾分光光度法等^[12]。

国内外对槟榔碱或多酚的药理活性和含量测定研究较多,但未见对槟榔醇提取物中槟榔碱和多酚含量的同时测定。本实验以乙醇为溶剂对海南槟榔进行提取,采用铁氰化钾分光光度法测定提取物中多酚的含量,采用高效液相色谱法测定提取物中槟榔碱的含量,并对多酚和槟榔碱的含量测定方法进行方法学验证。本实验将为海南槟榔乙醇提取物的药理活性研究提供物质基础,为海南槟榔深加工及市场开发提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 仪器与对照品

高液液相色谱仪,配 P230 II 高压恒流泵、UV230 II 紫外-可见检测器和 EC2006 色谱处理系统(大连依利特分析仪器有限公司);722N 型可见分光光度计(上海精密科学仪器有限公司);800B 型离心机(上海安亭科学仪器厂);AE-100 型电子分析天平(南京庚辰科学仪器有限公司),高速万能粉碎机(天津市泰斯特仪器有限公司)。

没食子酸(批号:111684-200401)和槟榔碱对照品(批

号:110831-201204)购自中国药品生物制品检定所;甲醇为色谱纯,乙醇、十二烷基磺酸钠、 FeCl_3 、 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 、 HCl 、乙腈、乙二胺溶液、磷酸均为分析纯;实验用水为二次去离子水。

1.2 试药

槟榔样品为海南产槟榔,采自海南省万宁市后安镇,经海南医学院中药学教研室田建平老师鉴定为槟榔(*Areca nut*, *Betel nut*)。

1.3 方法

1.3.1 槟榔样品溶液的制备 将鲜槟榔果洗净,切开,40℃烘干,粉碎。称取 20 g 槟榔粉末,按料液比 1:10、1:8、1:6 加 80%乙醇冷浸 3 d,提取 3 次,过滤,合并滤液,定容至 500 mL,得槟榔样品溶液。旋蒸,冷冻干燥,得槟榔乙醇提取物 16.20 g。收率 81.05%。

1.3.2 多酚的含量分析 准确移取 0.15 mL 样品溶液置于 25 mL 容量瓶中,加入 5 mL 无水乙醇,2 mL 0.3% 十二烷基磺酸钠和 0.6% FeCl_3 -0.9% $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (1:0.9)混合溶液 1 mL,混匀后暗处放置 5 min,用 0.1 mol/L HCl 溶液定容至刻度,混匀,暗处放置 20 min。用 722 型分光光度计,以显色剂为空白,在 720 nm 处测定吸光度 A。

1.3.3 HPLC 法 色谱柱为大连依利特 C_{18} 柱(4.6 mm × 200 mm, 5 μm);流动相为 80 mL 乙二胺溶液(磷酸调节 pH 至 7.5)与 20 mL 甲醇乙腈混合溶液(体积比为 20:30);流速 1.0 mL/min;柱温 25℃;检测波长为 215 nm;进样量 20 μL。

2 结果

2.1 槟榔提取物多酚的含量分析

2.1.1 对照品溶液的制备及标准曲线绘制 精密称取 0.005 30 g 没食子酸对照品,用无水乙醇溶解定容至 50 mL 容量瓶中,得到浓度为 106.0 mg/L 的没食子酸乙醇溶液。准确吸取没食子酸乙醇溶液 0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、0.60 mL 于 25 mL 容量瓶中,按上述实验方法显色、测定吸光度 A。以 A 为纵坐标,以没食子酸浓度为横坐标,绘制标准曲线,计算相关系数。结果见图 1。经统计学处理,得回归方程为: $A = 1.349c + 0.0407$, $R^2 = 0.9992$ 。结果表明没食子酸含量在 0.096~0.576 mg/L 范围内,呈现良好的线性关系。

图 1 多酚标准曲线

2.1.2 多酚含量的测定 准确吸取 0.15 mL 槟榔样品溶液置于 25 mL 容量瓶中,按上述实验方法显色、测定吸光度 A。根据标准曲线计算样品中多酚的含量为 10.54 mg/g。

2.1.3 精密度试验 取没食子酸对照品溶液 1.00 mL,按上述实验方法显色、测定吸光度 A。平行测定 6 次,计算结果的相对标准偏差(RSD)为 0.12%。

2.1.4 稳定性试验 准确移取没食子酸对照品溶液 1.00 mL,按上述实验方法显色,经显色反应后,分别在 15、20、25、30、35、40、45、50、55、60 min 测定,考察该分析方法的稳定性。结果见图 2。结果表明样品在 15 ~45 min 内稳定。

图 2 食子酸对照品溶液稳定性试验

2.1.5 重复性试验 精密称取 6 份样品粉末 0.2 g,按“槟榔样品溶液的制备”制得 6 份供试品溶液,按“样品中多酚含量的测定”进行显色和测定,计算结果的相对标准偏差(RSD)为 2.4%。

2.1.6 加标回收试验 精密称取已知多酚含量的样品 9 份,分别加入一定量的没食子酸对照品,按“槟榔样品溶液的制备”制得供试品溶液,按“样品中多酚含量的测定”进行显色和测定,计算加标回收率和 RSD,结果见表 1。从表 1 可以看出,平均回收率均为 101.40%,相对标准偏差 RSD 为 0.88%

表 1 加标回收试验结果 (n=9)

编号	样品质量 (g)	样品含量 (mg)	加入量 (mg)	测得量 (mg)	加标回收率 (%)	平均回收率 (%)	RSD (%)
1	0.050 3	0.530 2	0.424 1	0.954	99.85		
2	0.050 0	0.527 0	0.421 6	0.950	100.32		
3	0.051 0	0.537 5	0.430 0	0.968	100.21		
4	0.050 6	0.533 3	0.533 3	1.076	101.75		
5	0.050 5	0.532 3	0.532 3	1.069	100.76	101.40	0.88
6	0.051 0	0.537 5	0.537 5	1.083	101.55		
7	0.050 3	0.530 2	0.636 2	1.180	102.11		
8	0.050 2	0.529 1	0.634 9	1.195	104.81		
9	0.050 7	0.534 4	0.641 3	1.183	101.22		

2.2 槟榔提取物槟榔碱含量分析

2.2.1 对照品溶液的制备 精密称取槟榔碱对照品 10.0 mg,用甲醇溶解,定容至 10 mL。用 0.45 μm 滤膜过滤,取滤液作为对照品溶液。

2.2.2 标准曲线的绘制 分别取对照品溶液稀释配制

成 11.2、22.4、44.8、89.6、112、224 mg/L 的标准品溶液,各取 20 μL 进样,以峰面积 A 为纵坐标,槟榔碱浓度 c 为横坐标,绘制标准曲线,见图 3。

从图 3 可以看出,在选择的试验条件下,槟榔碱的浓度与峰面积呈良好的线性关系,回归方程为: $A = 36.555c - 116.78, R^2 = 0.9999$ 。

图 3 槟榔碱标准曲线

2.2.3 槟榔碱含量的测定

精密称取槟榔乙醇提取物 0.500 0 g,加甲醇溶解,用甲醇定容至 25 mL。用 0.45 μm 滤膜过滤,取滤液作为供试液,按“色谱条件”分析,样品和对照品溶液色谱图如图 4。根据标准曲线计算槟榔乙醇提取物中槟榔碱的含量为 1.935 μg/g。

(a) 槟榔碱对照品; (b) 槟榔乙醇提取物

图 4 槟榔乙醇提取物中槟榔碱色谱图

2.2.4 精密度试验 吸取槟榔碱对照品溶液,按“色谱条件”重复进样6次,计算峰面积的RSD为0.10%。

2.2.5 重复性试验 精密称取6份槟榔样品2.0g,按“槟榔样品溶液的制备”制得槟榔乙醇提取物,按“槟榔碱含量的测定”方法进样测定,计算RSD为1.8%。

3 讨论

槟榔作为四大南药之一,具有很好的药理活性。槟榔的主要活性成分为槟榔碱和多酚类物质。国内外对槟榔碱或多酚的含量测定研究较多,但未见对槟榔醇提取物中槟榔碱和多酚含量的同时测定。

本文采用有机溶剂提取法制得海南槟榔乙醇提取物,并建立了醇提取物中多酚和槟榔碱的含量测定方法。以没食子酸为对照品溶液,采用 $FeCl_3-K_3[Fe(CN)_6]$ 比色法对槟榔中多酚含量进行测定,测得槟榔乙醇提取物中多酚的含量为10.54 mg/g。以槟榔碱为对照品,采用HPLC法对槟榔醇提取物中槟榔碱的含量进行测定,得到槟榔提取物中槟榔碱的含量为1.935 $\mu g/g$ 。经方法学验证可知该方法的精密度和准确度均符合要求。

本研究将为海南槟榔乙醇提取物的药理活性研究提供物质基础,为海南槟榔深加工及市场开发提供科学依据。

参考文献

1 国家药典委员会.中华人民共和国药典[S].一部.北京:中国医药

科技出版社,2015:365.

- 2 庞玉新,王祝年.海南岛天然抗癌本草图鉴[M].一卷.中医古籍出版社,2009:248.
- 3 牟肖男,杨文强,王文婧,等.槟榔化学成分研究[J].暨南大学学报(自然科学版),2014,35(1):56-60.
- 4 高晓婷,杨大伟,蒋晨凤.基于多级错流提取槟榔生物碱的工艺优化[J].食品与机械,2015,31(6):182-258
- 5 张渝渝,杨大坚,张毅.槟榔的化学及药理研究概况.重庆中草药研究,2014,(1):37-41.
- 6 Huang Pei Ling, Chi Chin Wen, Liu Tsung Yun. Effects of areca catechu L. containing procyanidins on cyclooxygenase-2 expression *in vitro* and *in vivo*[J]. Food Chem Toxicology,2010,48(1):306-313.
- 7 田雪芬.槟榔青果不同方法提取物生物活性研究[D].郑州:河南大学,2015:1.
- 8 王光.槟榔碱的研究进展[J].国际病理科学工作者与临床杂志,2010,30(2):171-175.
- 9 Liu S T, Young G C, Lee Y C, et al. A preliminary report on the toxicity of arecolane on early pregnancy in mice[J]. Food chem toxicol,2010,49(1):144.
- 10 何际婵,董志超,王建荣.反相高效液相色谱法测定槟榔中槟榔碱的含量[J].中华中医药学刊,2011,29(9):1969-1971.
- 11 张丹,李丹,许启泰,等.槟榔提取物不同部位的抗氧化性比较及成分研究[J].食品工业科技,2015,36(2):102-109.
- 12 郑仕宏,张海德,何双,等.Folin-Ciocalteus法测定槟榔中多酚含量的研究[J].中南工业大学学报,2009,29(6):165-169.
- 13 付煜荣,张万明,陈桂敏,等.景天三七中没食子酸和总酚酸含量测定[J].中成药,2006,28(7):1016-1018.

(上接第2223页)

- 6 Sherman MP, Pritzl CJ, Xia C, et al.Lactoferrin acts as an adjuvant during influenza vaccination of neonatal mice[J]. Biochem Biophys Res Commun,2015,467(4):766-770.
- 7 Arcella A, Oliva MA, Staffieri S, et al.*In vitro* and *in vivo* effect of human lactoferrin on glioblastoma growth[J]. J Neurosurg,2015,123(4):1026-1035.
- 8 Li W, Zhu S, Hu J.Bone regeneration is promoted by orally administered bovine lactoferrin in a rabbit tibial distraction osteogenesis model[J]. Clin Orthop Relat Res,2015,473(7):2383-2393.
- 9 Zong X, Song D, Wang T, et al.LFP-20, a porcine lactoferrin peptide, ameliorates LPS-induced inflammation via the MyD88/NF- κ B and MyD88/MAPK signaling pathways[J]. Dev Comp Immunol,2015,52(2):123-131.
- 10 Hou JM, Xue Y, Lin QM.Bovine lactoferrin improves bone mass and microstructure in ovariectomized rats via OPG/RANKL/RANK pathway[J]. Acta Pharmacol Sin,2012,33(10):1277-1284.
- 11 Montesi M, Panseri S, Iafisco M, et al.Coupling hydroxyapatite nanocrystals with lactoferrin as a promising strategy to fine regulate bone homeostasis[J]. PLoS One,2015,10(7):e0132633.
- 12 Careba I, Gradinaru D, Chiva A, et al.Correlations between eyelid tumors and tear lipocalin, lysozyme and lactoferrin concentrations in postmenopausal women[J]. J Med Life,2015,8(1):94-98.
- 13 Hou JM, Chen EY, Wei SC, et al.Lactoferrin inhibits apoptosis through insulin-like growth factor I in primary rat osteoblasts [J]. Acta Pharmacol Sin,2014,35(4):523-530.

- 14 Vandrovцова M, Douglas TE, Heinemann S, et al.Collagen-lactoferrin fibrillar coatings enhance osteoblast proliferation and differentiation[J]. J Biomed Mater Res A,2015,103(2):525-533.
- 15 Wł odarski KH, Galus R, Brodzikowska A, et al.The importance of lactoferrin in bone regeneration[J]. Pol Merkur Lekarski,2014,37(217):65-67.
- 16 Montesi M, Panseri S, Iafisco M, et al.Coupling hydroxyapatite nanocrystals with lactoferrin as a promising strategy to fine regulate bone homeostasis[J]. PLoS One,2015,10(7):e0132633.
- 17 Li H, Wang Z, Fu Q, et al.Plasma miRNA levels correlate with sensitivity to bone mineral density in postmenopausal osteoporosis patients[J]. Biomarkers,2014,19(7):553-556.
- 18 Li SM, Zhou DX, Liu MY. Associations between polymorphisms of HLA-B gene and postmenopausal osteoporosis in Chinese Han population[J]. Int J Immunogenet,2014,41(4):324-329.
- 19 Kaleta B, Walicka M, Sawicka A, et al.Toll-like receptor 4 gene polymorphism C1196T in polish women with postmenopausal osteoporosis - preliminary investigation[J]. Adv Clin Exp Med,2015,24(2):239-243.
- 20 Kindler JM, Pollock NK, Laing EM, et al. Insulin resistance negatively influences the muscle-dependent IGF-1-bone mass relationship in premenarcheal girls [J]. J Clin Endocrinol Metab,2016,101(1):199-205.
- 21 Castilla-Cortá zar I, Gago A, Muñ oz Ú, et al.Mechanisms underlying testicular damage and dysfunction in mice with partial IGF-1 deficiency and the effectiveness of IGF-1 replacement therapy[J]. Urology,2015,86(6):1241.